

الاسبوع 12 - 13

### فترة النقاهة

ينصح بعدم الذهاب الى العمل لمدة اسبوعين .  
عدم ممارسة أي نشاط بدني شاق لمدة ستة أسابيع .

الاسبوع الحادي عشر

### العملية الجراحية

هذه العملية تستغرق تقريبا ساعة واحدة وتتم تحت تأثير التخدير العام وبالامكان مغادرة المستشفى في نفس اليوم.

وفي خلال اسبوعين تظهر تورمات في الجفون وبعدها تعود الجفون الى الوضع الطبيعي علما ان العملية لاتترك اي ندبات.

الاسبوع 10

### الكشف الطبي الثاني

إذا كانت نتيجة اختبار البوتكس إيجابية، فان فريق مركز جراحة الصداع النصفي سوف يناقش الاحتمالات مع المريض.

إذا لم تكن هناك تغيرات ملاحظه من خلال النتائج لاختبار البوتكس فان اطباء بامكانهم تقديم النصائح بشأن خيارات العلاج المتاحة.

الاسبوع 2 - 9

### مراحل الصداع النصفي ( الشقيقة )

إن الآثار المترتبة على البوتكس سوف تتضح بعد بضعة أيام. سوف يطلب من المريض أن يسجل في الاستمارة مراحل الصداع النصفي لمدة ثمانية أسابيع ، وتسجيل أي تغييرات في شدة الألم ، أو وتيرة تكرار الصداع النصفي.

الاسبوع الاول

### الكشف الطبي الاول

الكشف الطبي بالاضافة الى معلومات الاستمارة يساعد على تحديد العلاج المناسب.

بعد ذلك يتم استدعاء المريض من أجل اختبار البوتكس الذي يحدد مدى فرص نجاح التشخيص والعلاج .

### المرحلة التي تسبق زيارة الطبيب

قبل كل شيء يجب عليكم تعبئة الاستمارة الموجودة على موقعنا بشبكة الانترنت والاجابة على الأسئلة.

[www.migraine-surgery-center.com](http://www.migraine-surgery-center.com)



- 1 تتم العملية عن طريق شق جراحي في منطقة الجفن للوصول الى العضلات المعنية.
- 2 تشريح العضلة الرافعة للحاجب للوصول الى العصب التوأمي الثلاثي لازالة بعض اطرافه من أجل تخفيف الصداع النصفي.

